

Çocuklarda safra kesesi polipleri

Doç. Dr. Melih Akın
Çocuk cerrahisi uzm
Çocuk karaciğer, pankreas ve safra yolları cerrahisi

Safra kesesi polibi nedir?

Polipler

Safra kesesi



Safra kesesinin polipleri
genelde iyi huylu
kitlelerdir ama kanser
yapma özelliđi
taşıyabilirler!!!

Hangi hastalar safra kesesi polibi nedeniyle ameliyat edilmelidir?

Bir cm den büyük
veya semptomatik
olan hastalar
ameliyat
edilmelidir.

**Hangi semptomlar varsa
ameliyat edilmelidir?**

Bilier kolik; yemek sonrası başlayan saatler sürebilen genelde kramp tarzı olan karın ağrısı,

Dispeptik şikayetler: bulantı, kusma, yanma hissi, hazımsızlık, şişkinlik

Safra kesesinde polibi olan hastalar neden ameliyat edilmelidir?

Safra kesesindeki poliplerden sadece adenomatöz polipler, adenomiyomatozisler kansere dönüşürler,

Fibromlar, lipomlar, kolesterol polipleri, hemanjiomlar iyi huylu kitlelerdir, kanserleşmezler,

Ameliyat ile çıkarılmadan önce anlaşılamazlar!!!

Bu sebeplerle, 1 cm'den büyük veya semptomatik polipleri olan hastalarda laparoskopik safra kesesi çıkarma ameliyatı yapılmalıdır.

**Doç Dr Melih Akın
Çocuk Cerrahisi Uzm
mlhakin@gmail.com
05519650197**

**Ameliyat ile safra kesesi
alındığında kanser çıkarsa ne
yapılmalıdır?**

Tümörün yeri, büyüklüğü
ve evresine göre cerrahi
ve kemoterapi yapılması
gerekebilir.

Doç. Dr. Melih Akın

Çocuk Cerrahisi Uzm.

**Çocuk karaciğer, pankreas ve safra yolları
cerrahisi**

mlhakin@gmail.com

instagram: doc.dr.melih_akin

05519650197